



# เตือนการระบาด

ฉบับที่ 29/2566 วันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2566

## แมลงบั่ว (Rice gall midge)

### ระบาดมากในช่วงฤดูฝน

ข้าวระยะแตกกอบั่วเข้าทำลายมาก



ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Orseolia oryzae* (Wood - Mason)

- แมลงบั่วจะออกเป็นตัวเต็มวัยเมื่อเริ่มฤดูฝน
- แมลงบั่วจะเข้าแปลงนาตั้งแต่ระยะกล้า เพื่อวางไข่
- ตัวหนอนจะคลานลงสู่ชอกของใบยอดและกาบใบ เพื่อเข้าทำลายยอดที่กำลังเจริญ
- ทำให้เกิดเป็นหลอดลักษณะคล้ายหลอดหอม

### อาการต้นข้าวที่ถูกทำลาย



ทำลายยอดข้าวอ่อน ทำให้ข้าวแคระแกร็น เตี้ย ลำต้นกลม มีสีเขียวเข้ม



### การป้องกันกำจัด

- หมั่นกำจัดวัชพืชรอบแปลงนา เช่น ข้าวป่า หญ้า ข้าวนก หญ้าไซ หญ้าแดง หญ้าชันอากาศ เพื่อทำลายพืชอาศัยของแมลงบั่ว
- ทำลายตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นแสงไฟตามบ้าน ในช่วงเวลาประมาณ 19.00-21.00 น. โดยใช้ไม้ตีแมลงวัน