



ฉบับที่ 30/2566 วันที่ 7 เดือนสิงหาคม 2566

เตือนการระบาด



กัดเจาะยอดอ่อนของมะพร้าว

ทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์

ด้วงแรดมะพร้าว



- ตัวเต็มวัย กัดเจาะต้นและยอดอ่อนของมะพร้าว ทำลายยอดอ่อนที่ใบยังไม่คลี่
- ทำให้ใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายหางปลา
- ทำให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกรน
- รอยแผลที่ถูกด้วงแรดกัดเป็นเนื้อเยื่ออ่อน
- **ต้นเหตุให้ด้วงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่**
- เป็นทางให้เกิดยอดเน่าจนถึงต้นตายได้ในที่สุด

ลักษณะการเข้าทำลาย



การป้องกันกำจัด



1. **ใช้วิธีเขตกรรม** กำจัดแหล่งขยายพันธุ์ เช่น กองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองขยะ ทำลายส่วนของลำต้นและตอมะพร้าวออกไปจากบริเวณสวนที่โค่นทิ้งไว้
2. **ใช้วิธีกล** โดยทำความสะอาดบริเวณคอมะพร้าว ใช้เหล็กแหลมแทงตามรูหรือรอยแผลเพื่อกำจัดด้วงแรด
3. **ใช้ชีววิธี** ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ใส่ไว้ตามแหล่งขยายพันธุ์

4. **กับดักฟีโรโมน** เพื่อล่อด้วงแรดไปทำลาย
5. **สารชีวภัณฑ์** ใช้ **เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม** คลุกในกองปุ๋ยคอกขนาดกองปุ๋ยคอก 4 ต.ม ลึกประมาณ 0.5 เมตร คลุกเชื้อราในกองปุ๋ยคอก อัตรา 0.5 - 1 กก./กองปุ๋ย 1 กอง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ไร่