



ฉบับที่ 31/2566 วันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2566

เตือนการระบาด

แมลงสิง (RICE BUG)



ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Leptocorisa acuta (Thunberg)

ดูดกินน้ำเลี้ยงจากเมล็ดข้าว

โดยเฉพาะข้าวในระยะน้ำนม
ทำให้เมล็ดลีบ หรือเมล็ดไม่สมบูรณ์

- ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากแทงดูดกินน้ำเลี้ยงจากเมล็ดข้าว
- ทำให้เมล็ดลีบ หรือเมล็ดไม่สมบูรณ์และผลผลิตข้าวลดลง
- ทำให้ข้าวเสียคุณภาพมากกว่าทำให้น้ำหนักเมล็ดลดลง และเมื่อนำไปสีจะแตกหักง่าย
- แมลงสิงเริ่มพบในต้นฤดูฝน
- เจริญเติบโต ขยายพันธุ์บนพืชอาศัยพวกวัชพืชตระกูลหญ้า
- พบมากในนาข้าวและข้าวไร่
- ถ้ามีแมลงสิงระบาดในนาข้าวจะได้กลิ่นเหม็นฉุน



การป้องกันกำจัด



1. กำจัดวัชพืชในนาข้าว คัดนาและรอบๆแปลง
2. ใช้สวิงโฉบจับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในนาข้าวที่พบระบาดและนำมาทำลาย
3. ตัวเต็มวัยชอบกินเนื่อเน่า น้ำเนื่อเน่าแขวนไว้ตามนาข้าว และจับมาทำลาย
4. หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่ขยายพันธุ์
5. ใช้สารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซี) อัตรา 80 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อแมลงสิงมากกว่า 4 ตัวต่อตารางเมตรในระยะข้าวเป็นน้ำนม



บ้านสวนพอเพียง

ลักษณะการทำลายของแมลงสิง

ที่มา : กรมการข้าว

จัดทำโดย : นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง



สว.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

<http://www.ayutthaya.doae.go.th>

035-336560



กรมส่งเสริมการเกษตร