



เตือนการระบาด


ฉบับที่ 32/2566 วันที่ 18 เดือนสิงหาคม 2566

แมลงห้ำ (Black bugs)



ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Scotinophara coarctata (Fabricius)



ชอบหลบซ่อนอยู่ที่โคนต้นข้าว หรือตามรอยแตกของพื้นดินในตอนกลางวัน

การป้องกันกำจัด

- สำหรับการใช้สารฆ่าแมลงให้ใช้ไธอะโทแซม (แอททารา 25 WG) หว่าน อัตรา 12-16 กรัมต่อไร่ หรือไดโนทีฟูเรน (สตาร์เกิล 10 SL) อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% EC) อัตรา 80 มิลลิเมตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฟ่นหรือเฉพาะจุดที่มีการระบาดโดยฟ่นบริเวณ โคนต้นข้าว จะสามารถป้องกันเจ้าแมลงห้ำได้ทันทั่วทั้งที่

ดูกินน้ำเลี้ยงจากขาใบข้าว

หลบซ่อนอยู่ที่โคนต้นข้าวหรือตาม รอยแตกของพื้นดิน



- ทำลายในช่วงข้าวแตกกอเต็มที่ถึงเก็บเกี่ยว
- โดยวางไข่ที่ใบข้าวบริเวณโคนต้นข้าวใกล้ระดับผิวน้ำ หรือบนพื้นดิน
- หากินในตอนกลางคืน
- ชอบใบข้าวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำคล้ายข้าวเป็นโรคไหม้
- ระยะข้าวแตกกอทำให้กอข้าวมีอาการแคระแกร็น มีสีเหลืองหรือเหลืองแกมน้ำตาล และการแตกกอลดลง
- ระยะข้าวตั้งท้องทำให้รวงข้าวแกร็น รวงข้าวมีเมล็ดลีบ

การป้องกันกำจัด

- ใช้แสงไฟฟาล่อแมลงและทำลายในช่วงที่มีการระบาด เนื่องจากแมลงห้ำชอบบินมาเล่นแสงไฟเวลากลางคืน
- กำจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นในนาข้าว เพื่อให้ข้าวโปร่ง แสงแดดส่องถึงโคนต้นข้าวทำให้สภาพนาข้าวไม่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย



ชอบใบข้าวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำคล้ายข้าวเป็นโรคไหม้