



DOAE
กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaya09@gmail.com Tel 035-336344 Fax 035-335441



เตือนภัยการระบาด “โรคกล้า嫩่าในระบบเพาะ”

ปีที่ 5 ฉบับที่ 19/2565 วันที่ 4 เมษายน 2565

โรคกล้า嫩่าในระบบเพาะ (Seedling Rot Disease in Nursery Box)

พบมาก ในระบบตอกกล้าที่ใช้กับรถปักด้า ในพื้นที่ที่ใช้เครื่องปักด้าข้าว

สาเหตุ เชื้อร้า Curvularia lunata (Wakk.) Board. / Bipolaris oryzae (Helminthosporium oryzae Breda de han)

อาการ เริ่มพบอาการได้ในระยะหลังจากการตอกกล้าข้าวในระบบเพาะโดยจะเริ่มพบเมล็ดข้าวบางส่วนที่เพาะไม่ออกและมีเส้นใยของเชื้อราปกคลุม ส่วนเมล็ดที่ออกดันกล้าจะมีการเจริญเติบโตช้ากว่าต้นกล้าข้าวปกติ และเมื่อถอนต้นกล้าข้าวขึ้นมาดู ก็จะพบส่วนรากและโคนต้นกล้ามีแผลสีน้ำตาล และแผลที่เกิดบนโคนต้นจะลุกตามขึ้นไปปังส่วนบนของต้นกล้า ต่อจากนั้นจะทำให้ต้นกล้าน่าตาย ในขณะเดียวกันเชื้อร้าสาเหตุของโรคจะขยายจากจุดเริ่มต้นที่เป็นโรค ออกไปบริเวณโดยรอบไปยังต้นกล้าข้างเคียง โดยในกรณีที่มีการตอกกล้าที่หนาแน่น เชื้อร้าสาเหตุของโรคสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของระบบเพาะได้อย่างรวดเร็ว ต่อจากนี้จะพับอาการตายของต้นกล้าข้าวเป็นหย่อมๆ กรณีที่เป็นโรคในระบบกล้ารุนแรงทำให้ไม่สามารถนำต้นกล้าขึ้นมาได้



กล้าในระบบเพาะเน่าตาย



อาการกล้าเน่าหลังออก

การ-prevention โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นโรคเมล็ดด่างมากทำการตอกกล้า

การป้องกันกำจัด

1. ไม่ควรใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่มีการระบาดของโรคเมล็ดด่างมาก่อน
2. คุณภาพเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เชื้อร้าไตรโตรเดอร์ม่า อัตรา 100 กรัม/ เมล็ด 1 ก.ก.
3. ล้างทำความสะอาดระบบกล้าหลังได้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ได้แก่สารคลอรีน เพาห์ลายต้นกล้าข้าวที่เป็นโรคเน่าตายในระบบเพาะ

นางสาววัลลิษา บิตามาตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

E-mail : phakhai08@hotmail.com โทร.035-391672 ,0881769696

จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ (กลุ่มงานอาชักษะพืช)



DOAE
กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaya09@gmail.com โทร 035-336344 Fax 035-335441



เตือนภัยการระบาด “โรคโコンเน่า (ต้นกล้า)”

ปีที่ 5 ฉบับที่ 20/2565 วันที่ 11 เมษายน 2565

โรคโコンเน่า (ต้นกล้า)

สาเหตุ เชื้อรากในดิน ซึ่งมีหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ ซึ่งเชื้อรากนี้มาได้จาก (1) ติดมากับเมล็ด (2) ในดินและวัสดุปลูก (3) ในน้ำที่ใช้รดน้ำ (4) จากภาชนะที่ใช้เพาะกล้า สภาพแวดล้อมที่ทำให้เชื้อรากระบาดได้ง่ายคือ เมื่อมีอากาศร้อนและมีความชื้นสูง ดิน/วัสดุเพาะชำยาน้ำไม่ดี และมีสภาพเป็นกรดมากเกินไป

อาการ เป็นตัวตั้งแต่กำไหเมล็ดไม่ออก หรือเมล็ดออกเป็นต้นอ่อนแล้วตาย หรือจะการเจริญเติบโต สังเกตได้จากแพลงท์โคนต้นบริเวณที่ติดกับผิวเดิน ที่ทำให้ต้นคอตลง/แห้ง ต้นล้ม ไม่ตั้งขึ้น ซึ่งอื่น โรคเน่าคอดิน โรครากรเน่าโコンเน่า กล้ายายพราย



วิธีป้องกัน

- เลือกใช้ดิน/วัสดุปลูกที่ค่อนข้างสะอาด ระบายน้ำได้ดี
- เพิ่มสัดส่วนของปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ำใส่เดือนในวัสดุเพาะ เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
- ทำความสะอาดด้วยด่างทับทิม (อัตราส่วน 1 กรัม/น้ำ 1 ลิตร ใช้เช่นทึ่งไว้ 2 – 3 ชั่วโมง) โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาโรคโコンเน่าแล้ว ถ้าหากไม่มีกาสที่จะมีเชื้อติดอยู่มาก
- ถ้าเมล็ดมีความเสี่ยงติดเชื้อราก อาจทำความสะอาดเมล็ดก่อนเพาะด้วยจุนสี (อัตราส่วน 1 กรัม/น้ำ 1 ลิตร ใช้เช่นทึ่งไว้ 2 – 3 ชั่วโมง แล้วล้างออกก่อนนำไปเพาะ)
- ใช้เชื้อตัวโคเตอร์มาร์สมกับดินปลูก คลุกเมล็ด หรือผสมกับน้ำที่ใช้รดกล้าผัก
- เวลาเพาะกล้า อย่าใส่เมล็ดในวัสดุเพาะเล็กเกินไป
- อย่าเพาะกล้าหนาแน่นเกินไป เลือบริเวณเพาะกล้าที่มีสภาพอากาศไปร่วม อากาศระบายได้ดี ไม่มีความชื้นสูง และระวังอย่าดันน้ำมากเกินไป โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
- เลือกแหล่งน้ำที่สะอาดหน่อยสำหรับใช้ในการรดน้ำผัก
- ในกรณีที่แปลง/ภาคเพาะเริ่มระบาด ให้รับนำด้วยมีรีโคอก เพื่อทำลายพืช และฉีดพ่นแปลง/ภาคเพาะ ข้างเคียงน้ำด้วยน้ำกระเทียมสะกัด (ต้มน้ำให้ร้อน แต่ไม่ถึงน้ำเดือด ใช้กระเทียมโซลก 5 – 6 กลีบ นาน 20 นาที ปล่อยให้น้ำเย็น เอากระเทียมออก เติมน้ำกลับเข้าไปอีกครึ่ง แล้วจึงนำไปฉีดพ่น

นางสาววัลวิชา ปิติมาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

E-mail : phakhai08@hotmail.com โทร.035-391672 ,0881769696

จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอผักใต้ (กลุ่มงานอารักษาพืช)



DOAE
กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaya09@gmail.com Tel 035-336344 Fax 035-335441



เตือนภัยการระบาด “เพลี้ยไฟข้าว”

ปีที่ 5 ฉบับที่ 21/2565 วันที่ 18 เมษายน 2565

เพลี้ยไฟข้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Stenchaetohrips biformis* (Bagnall)

เพลี้ยไฟ เป็นแมลงจำพวกปูกดูด ขนาดเล็กลำตัวยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร มีทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก ตัวเต็มวัยมีสีดำ ตัวอ่อนสีเหลืองอ่อน ตัวเต็มวัยวางไข่ในเนื้อเยื่ออ่อนของใบข้าว ตัวอ่อน มี 2 ระยะ ระยะเวลาตั้งแต่ตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยนานประมาณ 15 วัน

ลักษณะการทำลายและการระบาด

เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าวที่ยังอ่อนโดยอาศัยอยู่ตามซอกใบ ในระยะแรกจะเห็นใบข้าวเป็นสีเขียวขาวๆ ต่อมาก็เหลือง เจริญช้าแล้วค่อยๆ บานตามความยาวเข้ามาสู่กลางใบ ต้นกล้าอาจแห้งตายได้ เมื่อข้าวโตขึ้นไปที่ถูกทำลายจะปรากฏอาการปลายใบเที่ยวขوبใบจะมีน้ำเข้าหากกลางใบและเพลี้ยไฟจะอาศัยอยู่ในใบที่ม้วนนั้น ทั้งยังพบทำลายข้าวในระยะกล้าหรือหลังปักต่ำ 2-3 สัปดาห์ โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทึ่งช่วงนานติดต่อกันหรือสภาพนาข้าวที่ขาดน้ำ ถ้าระบาดมากๆ ทำให้ต้นข้าวแห้งตายได้ทั้งแปลง

วิธีป้องกันกำจัด

1. ดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ

2. ไข่น้ำท่อมยอดข้าวทึ่งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 วันหลังหว่าน



นางสาววัลวิชา ปิติมาศร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

E-mail : phakhai08@hotmail.com โทร.035-391672 , 0881769696

จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอผักไก่ (กลุ่มงานอาชีวศึกษาพืช)