



DOAE  
กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : [avutthaya09@gmail.com](mailto:avutthaya09@gmail.com) โทร 035-336344 Fax 035-335441



## เตือนภัยการระบาด โรคใบขีดปะรังแสง



ปีที่ 4 ฉบับที่ 23/2564 วันที่ 8 มิถุนายน 2564

### โรคใบขีดปะรังแสง (Bacterial Leaf Streak Disease)

พบมาก ในนาข้าว และ นาขอลประเทศไทย ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้

สาเหตุ เชื้อแบคทีเรีย *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzicola* (Fang et al.) Swings et al.

อาการ โรคนี้เป็นได้ตั้งแต่ระยะข้าวแตกกอจนถึงออกวง อาการปรากฏที่ใบ ริมแรกเห็นเป็นขีดข่ายยาวไปตามเส้นใบ ต่อมาก่อๆ เป็นสีเหลืองหรือส้ม เมื่อแพลงขยายรวมกันก็จะเป็นแพลงใหญ่ แสดงสามารถลุกลามได้ และพบแบคทีเรียในรูปหดด้านสีเหลืองคล้ายยางสนกลมๆ ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดประภากวอยูบันแพลงความยาวของแพลงขึ้นอยู่กับความด้านทางของพันธุ์ข้าว และความรุนแรงของเชื้อ ในพันธุ์ที่อ่อนแอดื้อโรค แพลงจะขยายจนไปใหม่ไปถึงกาบไป ลักษณะของแพลงจะคล้ายคลึงกับเกิดบนใบ ส่วนในพันธุ์ด้านทาง จำนวนแพลงจะน้อยและแพลงจะไม่ขยายตามความยาวของใบรอบๆ แพลงจะมีสีน้ำตาลดำ

การแพร่ระบาด ในสภาพที่มีฝนตก ลมพัดแรง จะช่วยให้โรคแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางรวดเร็ว และถ้าสภาพแวดล้อมมีเมฆาสม ใบข้าวที่แตกใหม่อาจไม่แสดงอาการโรคเลย

#### การป้องกันกำจัด

- ในดินที่อุดมสมบูรณ์มีควรใส่ปุ๋ยในโตรเจนมาก
- "ไม่ควรปลูกข้าวแน่นเกินไปและอย่าให้ระดับน้ำในนาสูงเกินควร"



นางสาววิชิตา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร : รายงาน

E-mail : [phakhai08@hotmail.com](mailto:phakhai08@hotmail.com) โทร.035-391672 ,0881769696

จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอผักใต้ ( กลุ่มงานอาชีวชาชีว )



## เตือนภัยการระบาด โรคลำต้นเน่า



ปีที่ 4 ฉบับที่ 25/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564

### โรคลำต้นเน่า (Stem Rot Disease)

พบมาก ใน นาข้าวฟัน และ นาขลประทาน ใน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้  
สาเหตุ เชื้อราก *Sclerotium oryzae* Catt.

อาการ เริ่มพบอาการได้ในระยะต้นข้าวก่อนอกรวงหรือหลังอกรวงแล้ว โดยจะพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลดำใกล้  
ระดับน้ำและแผลจะขยายใหญ่ขึ้นและลงตามกาบใบของต้นข้าว และในขณะเดียวกันภายในลำต้นก็จะมีแผลมี  
ลักษณะเป็นชี้ฟissula แล้วต้นข้าวเป็นโรคครุณแรง ในล่างของต้นข้าวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส่วนของกาบใบและ  
ลำต้นจะเน่า ต้นข้าวล้มง่ายและเมื่อตึงต้นข้าวก็จะหลุดออกจากกอได้ง่าย ต้นข้าวจะตายก่อนอกรวง แต่ถ้ามี  
การระบาดของโรคไม่รุนแรงหรือโรคเกิดขึ้นในระยะต้นข้าวหลังอกรวงแล้ว จะมีผลทำให้ผลผลิตของข้าวลดลงได้  
และเมื่อต้นข้าวเป็นโรคและแห้งตายก็จะพบเม็ดขยายพันธุ์ของเชื้อรากสาเหตุของโรคมีสีดำผ่องใส่ในเนื้อเยื่อของ  
กาบใบและตามปล้องของต้นข้าว เม็ดขยายพันธุ์ของเชื้อรากสาเหตุของโรคสามารถตกค้างอยู่บนตอซังข้าวและ  
ในดินได้เป็นระยะเวลานาน

การแพร่ระบาด เนื่องจากเชื้อรากสาเหตุจะสร้างเม็ดขยายพันธุ์ที่ติดค้างอยู่ในตอซังข้าวและดิน ในขณะเดียวกัน  
ก็สามารถถ่ายทอดผ่านน้ำและแพะกระจาดไปกับน้ำในนาข้าวได้เช่นกัน



#### การป้องกันกำจัด

- เลือกปลูกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
- ฉีดพ่นสารไตรโคเดอร์อัตราส่วน 1 กก./ไร่ ทุก 15 วัน เพื่อป้องกันการเกิดโรค
- ไม่ควรใส่ปุ๋ยในโตรเจนสูงในแปลงที่เป็นโรค
- หลังเก็บเกี่ยวข้าว และเริ่มฤดูใหม่ ควรพอกไนหน้าดิน เพื่อทำลายเม็ดขยายพันธุ์ของเชื้อราก  
เก็บบำบัดจากพืชที่เป็นโรคออกจากแปลง
- หมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มพบโรคพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น  
พีซีเอ็นบี คารบอคซิน วาลิดามัยชิน

นางสาววัลวิชา ปิติมาตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร : รายงาน

E-mail : [phakhai08@hotmail.com](mailto:phakhai08@hotmail.com) โทร.035-391672 ,0881769696

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค ( กลุ่มงานอาชีวศึกษาพืช )



**DOAE**  
กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : [ayutthaya09@gmail.com](mailto:ayutthaya09@gmail.com) Tel 035-336344 Fax 035-335441



## เตือนภัยการระบาด โรคใบสีส้ม



ปีที่ 4 ฉบับที่ 22/2564 วันที่ 4 มิถุนายน 2564

โรคใบสีส้ม (Rice Tungro Disease or Yellow Orange Leaf Disease)

พบมาก ในนาขลปละพานภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง

อาการ ต้นข้าวเป็นโรคได้ พังระยะกล้า แตกกอ ตั้งท้อง หากข้าวได้รับเชื้อในระยะกล้าถึงระยะแตกกอ ข้าวจะเสียหายมากกว่าได้รับเชื้อในระยะตั้งท้องถึงระยะออกровง ข้าวริมแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อ 15-20 วัน อาการเริ่มต้นในข้าวจะเริ่มมีสีเหลืองสลับเขียว ต่อมากจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เริ่มจากปลายใบเข้าหาโคนใบ ถ้าเป็นรุนแรงในระยะกล้าต้นข้าวอาจถึงตาย ต้นที่เป็นโรคจะเตี้ยแคระแกรน ช่วงลำต้นสั้นกว่าปกติมาก ใบใหม่ที่ผลลัพธ์ออกมาจะทำให้รูปร่างต่างก้าวข้อต่อไปล้ำสุด ถ้าเป็นรุนแรงอาจตายทั้งกอ ถ้าไม่ตายจะอกรวงล่าช้ากว่าปกติให้ร่วงเล็ก หรือไม่อกรวงเลย

การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสสาเหตุโรคถ่ายทอดได้โดยแมลงพาหะ คือ เพลี้ยจั้งสีเขียว



การป้องกันกำจัด

- ใช้พันธุ์ข้าวต้านทานแมลงเพลี้ยจั้งสีเขียว
- กำจัดวัชพืช และพืชอาศัยของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะนำโรค
- ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารบิวเวอร์เรีย อัตราส่วน 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเย็น ทุก 3-4 วัน เพื่อกำจัดแมลงพาหะ
- ไม่ใช้สารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ เช่น ไซเพอร์มิทริน ไซอาโลทริน เคลต้ามิทริน



นางสาววัลวิชา ปิมมาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร : รายงาน

E-mail : [phakhai08@hotmail.com](mailto:phakhai08@hotmail.com) โทร.035-391672 ,0881769696

จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอฝักใหญ่ ( กลุ่มงานอารักษ์พืช )